

## Scoring en normering van de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)

Bereken de gemiddelden per schaal door de scores op de afzonderlijke items op te tellen en te delen door het aantal items per schaal. Item 11 wordt in twee subschalen meegewogen.

Subschaal 'Lijnen': 5 items (1, 2, 3, 4, 5)

Subschaal 'Zorgen om eten': 5 items (6, 7, 9, 15, 34)

Subschaal 'Zorgen om gewicht': 5 items (11, 14, 29, 31, 32)

Subschaal 'Zorgen om lichaamsvorm': 8 items (10, 11, 12, 13, 30, 33, 35, 36)

Bereken de totaalscore door de gemiddelde scores van de vier subschalen op te tellen en te delen door het aantal subschalen (4).

### Normering EDE-Q

	AN		BN		BED		Eetstoornis NAO		Geen eetstoornis	
EDE-Q totaal	(N = 382)		(N = 180)		(N = 112)		(N = 261)		(N = 235)	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
	4,17	1,30	4,34	1,04	3,46	0,98	3,83	1,40	0,93	0,86
Percentiel rangscore	Percentiel-score		Percentiel-score		Percentiel-score		Percentiel-score		Percentiel-score	
5	1,50		2,46		1,98		1,09		0,04	
10	2,18		2,91		2,32		1,55		0,09	
15	2,61		3,27		2,45		1,96		0,18	
20	2,95		3,55		2,59		2,70		0,23	
30	3,73		4,06		2,95		3,25		0,32	
40	4,18		4,41		3,23		3,68		0,45	
50	4,55		4,57		3,50		4,32		0,64	
60	4,86		4,85		3,77		4,50		0,89	
70	5,09		5,00		3,91		4,77		1,15	
80	5,32		5,18		4,23		5,09		1,63	
85	5,41		5,27		4,45		5,18		1,87	
90	5,50		5,40		4,73		5,35		2,29	
95	5,64		5,55		5,24		5,50		2,69	
100	6,00		6,00		5,68		6,00		4,59	

Bron: Aardoom et al. (2012)

AN = anorexia nervosa; BN = boulimia nervosa; BED = binge eating disorder; eetstoornis NAO = eetstoornis niet anders omschreven